


WILLKOMMEN ZU HAUSE


Katzen, die einen Klinikaufenthalt hinter sich haben, sind oft sehr aufgeregt und kommen nicht immer direkt zur Ruhe. Dies ist kein Grund zur Sorge.

Sollte am Abholtag eine Narkose erfolgt sein, so kann es sein, dass Ihre Katze noch sehr ruhig, wackelig und evtl. desorientiert wirkt. Dies ist normal. Geben Sie ihr Zeit und sprechen Sie ruhig mit ihr.



Sollte eine OP erfolgt sein und Ihr Tier eine Naht haben, so ist es dringend erforderlich jegliches Lecken zu verhindern. Der Speichel von Katzen enthält viele Bakterien, die zu einer unter Umständen lebensbedrohlichen Entzündung führen können und eine evtl. weitere OP nötig wird. Benutzen Sie den von Ihrem betreuenden Tierarzt empfohlenen Leck- und Kratzschutz.

Die erste Gewöhnung an den Halskragen ist manchmal schwierig, Katzen stoßen gerne mit einem Halskragen an, gehen plötzlich nicht weiter oder rückwärts und versuchen ihn abzustreifen. Geben Sie ihrer Katze Zeit! Je nach Fall kann der Leckschutz kurzzeitig unter Beobachtung z.B. während des Fütterns abgenommen werden. Bedenken Sie jedoch, dass es nur Sekunden braucht in denen Ihre Katze an der Naht lecken oder die Fäden entfernen kann!



Wenn Medikamente verschrieben worden sind, so verabreichen Sie diese unbedingt wie verordnet.

Nach manchen chirurgischen Eingriffen kann es sein, dass Ihre Katze in einem Raum oder einer Box ruhig gehalten werden muss. In solchen Fällen können Bereiche abgetrennt werden oder aber ein Laufstall für Kinder aufgebaut werden.

Sollte sich Ihre Katze unnormal verhalten, sich zurückziehen und weniger Futter aufnehmen als Sie dies kennen, kontaktieren Sie uns gerne.

PARTNERTIER

Wenn Sie ein Partnertier im Haus haben, so kann es sein, dass dieses auf den veränderten Geruch der nach Hause kommenden Katze reagiert. Lassen Sie die Katzen bei einer Zusammenführung nicht alleine. Es kann helfen, dass die aus der Klinik kommende Katze ihren normalen Geruch zunächst wieder annimmt, bevor Sie weitere Katzen dazu lassen. Unterstützend kann Feliway® eingesetzt werden.

